

SLEEPY®

INSOMNIO OCASIONAL

**Difenhidramina
Clorhidrato 25 mg**

Comprimidos recubiertos
Venta libre - Industria Argentina

Lea atentamente el prospecto
contiene información importante para usted.



Si los síntomas
persisten por más
de 7 días o empeoran,
consulte a su médico.

CONDUCCIÓN VEHICULAR Y USO DE MÁQUINAS:

Este medicamento causa
somnialecia poco después
de ingerirlo, no se debe conducir
ni utilizar maquinaria
durante las 8 horas siguientes
de tomarlo.

¿Qué contiene Sleepy®?

Cada comprimido recubierto contiene:

Ingrediente activo: Difenhidramina clorhidrato 25 miligramos.

Excipientes: Cellactose 80 218,50 mg, Croscarmelosa sódica 4,00 mg, Aerosil 200 0,50 mg, Estearato de magnesio 2,00 mg, Azul brillante laca alumínica 0,15 mg, Lay AQ 8,00 mg.

Este medicamento contiene difenhidramina clorhidrato, perteneciente al grupo de medicamentos denominados antihistamínicos.

Acción: Efecto sedante y facilitador del sueño.

¿Para qué se utiliza Sleepy®?

Indicado para ayudar a conciliar el sueño en caso de **insomnio ocasional nocturno**, para ser utilizado por períodos cortos de tiempo.

¿Qué personas no pueden tomar este medicamento?

Si usted es alérgico a cualquiera de los componentes de la fórmula. Si está embarazada o en período de lactancia. Si está recibiendo IMAO (inhibidores de la mono amino oxidasa) o antidepresivos tricíclicos. Si es menor de 18 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Sleepy®?

No utilice este producto si usted:

- Está consumiendo otros medicamentos con difenhidramina.
- Está consumiendo sedantes.
- Tiene asma.
- Tiene una úlcera en el estómago o una obstrucción de intestino y/o vejiga.
- Padece de glaucoma de ángulo cerrado (presión ocular).
- Padece problemas de agrandamiento de próstata o de retención de orina.
- Padece porfiria (una enfermedad de la sangre).

Consulte a su médico antes de tomar este producto si usted:

- Tiene enfermedad del hígado y/o riñón.
- Bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Padece otro tipo de glaucoma.
- Padece dificultad para orinar.
- Miastenia gravis (enfermedad del músculo).
- Padece ataques epilépticos.
- Padece una condición denominada tinnitus, (zumbidos en los oídos).

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Sleepy®?

Deje de tomar este medicamento y consulte INMEDIATAMENTE a un médico si presenta:

- Hinchazón en la cara, labios, lengua y/o garganta.
- Dificultad para tragar y/o respirar.
- Sarpullido en la piel.

Los síntomas anteriormente mencionados pueden significar que usted está padeciendo una reacción alérgica grave a este medicamento.

Consulte a su médico si mientras toma este medicamento siente malestar, nota cualquier efecto inusual o experimenta alguno de estos síntomas:

- Dolor de cabeza.
- Movimientos musculares involuntarios o dificultad para coordinar.
- Malestar del estómago, vómitos.
- Presión arterial baja; latidos rápidos, más lentos o irregulares del corazón.
- Confusión, depresión.
- Enfermedad en el hígado.
- Trastornos del sueño, temblores, convulsiones, aumento de la transpiración.
- Dolor muscular y rigidez, dolor punzante, contracciones musculares, inestabilidad.
- Retención de orina y dificultad para orinar.
- Tinnitus.
- Urticaria.
- Disminución del sentido del tacto.
- Inquietud, excitación y reducción de la atención.
- Aumento de la energía.
- Moco bronquial más espeso.

Los siguientes son efectos secundarios no deseados leves y observados 8 horas luego de tomar este medicamento:

- Visión borrosa, mareos, somnolencia, sensación de nerviosismo.
- Boca seca.
- Náuseas (sensación de malestar del estómago).

¿Cómo se usa este medicamento?

Adultos mayores de 18 años: 1 o 2 comprimidos recubiertos al momento de dormir.

Si los síntomas persisten por más de 7 días o empeoran, consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más de la cantidad necesaria?

Concurra al hospital más cercano y/o comuníquese con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez - Tel. (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas - Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel. (0221) 451-5555.

Presentaciones: Envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

Forma de conservación: Conservar a temperatura ambiente no mayor de 30°C. Mantener el producto en su envase original, al abrigo de la luz y la humedad. Conservar en el envase original. No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O
FARMACEUTICO.**

¿TIENE USTED ALGUNA CONSULTA?


En ese caso comuníquese con **GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.** al 0800-444-3666 o bien al teléfono ANMAT RESPONDE 0800-333-1234.



Genomma Lab®

GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.
Int. Amaro Ávalos 4244/4248,
Munro, Partido de Vicente López, Prov. de Buenos Aires.
Director Técnico: Diego Bauerberg - Farmacéutico.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud
Certificado Nº 56.382.

Fecha de última revisión del prospecto aprobado por ANMAT:



Ayuda a **CONCILIAR**
el **SUEÑO**